



  
**TEAM**  
VOTRE **CHEVAL**, NOTRE **EXIGENCE**.

# OPTIMUM



**TRAVAIL SOUTENU  
À INTENSIF**



**GRANULÉ**



**COMPLÉMENTAIRE  
DE FOURRAGES**



**MATIÈRES  
PREMIÈRES  
locales**



Apports d'oligo-éléments sous forme biodisponible



A distribuer en complément de fourrages

Disponible  
en **vrac** et **big bag**

Code produit :  
vrac : 5782203V00  
big bag : 5782203B10

Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur  
[cheval-alimentation.com](http://cheval-alimentation.com)



Scannez-ici !



VOTRE CHEVAL, NOTRE EXIGENCE.

# OPTIMUM

Aliment granulé complémentaire de fourrages

## CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute	12 %
Matière grasse brute	2.80 %
Cellulose brute	10 %
Cendres brutes	7.10 %
Sodium	0.30 %
Phosphore	0.52 %
Calcium	1.20 %

## VITAMINES :

Vitamine A	10000 UI/kg
Vitamine D3	1500 UI/kg
Vitamine E	200 UI/kg

## OLIGO-ÉLÉMENTS :

Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté)	24 mg/kg
Cuivre (chélate de cuivre (II) de glycine hydraté)	6 mg/kg
Fer (sulfate de fer monohydraté)	72 mg/kg
Fer (chélate de fer (II) de glycine hydraté)	18 mg/kg
Manganèse (oxyde de manganèse)	40 mg/kg
Manganèse (chélate de manganèse de glycine)	10 mg/kg
Zinc (oxyde de zinc)	72 mg/kg
Zinc (chélate de zinc de glycine hydraté)	18 mg/kg
Iode (iodure de potassium)	0.48 mg/kg
Sélénium (sélénite de sodium)	0.15 mg/kg
Sélenométhionine	0.15 mg/kg

**UFC :** 0.85 **MADC :** 94 g/kg **LYSINE :** 0.40 %

Ingrédients : se référer sur les sacs ou bons de livraison

## PROGRAMMES ALIMENTAIRES

Poids du cheval	Quantité à distribuer par jour
300 kg	2,6 à 3,9 kg (4 à 6 L)
400 kg	3,25 à 4,55 kg (5 à 7 L)
500 kg	3,9 à 5,85 kg (6 à 9 L)
600 kg	5,2 à 6,5 kg (8 à 10 L)

**1L** ≈ **650**  
grammes

Ces rations sont préconisées sur la base d'un apport de foin minimum d'1 kg pour 100 kg de poids vif sur litière paille. Elles sont à moduler en fonction de la qualité et la quantité de fourrages disponibles ainsi que de l'état général et le niveau d'activité du cheval. En cas de litière artificielle, augmentez les apports en foin de 2 à 3 kg supplémentaires par jour. La distribution du nouvel aliment devra s'effectuer de façon progressive grâce à une transition avec le précédent aliment sur 8-10 jours minimum. Rations en 2 ou 3 repas par jour avec eau pure et tempérée à volonté.